



<http://www.biodiversitylibrary.org>

Revue zoologique africaine.

Bruxelles :Hayez, 1911-1928.

<http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/10603>

v.2, 1912-1913: <http://www.biodiversitylibrary.org/item/42171>

Page(s): Page 155, Page 156, Page 157, Page 158, Page 159, Page 160, Page 161

Contributed by: American Museum of Natural History Library

Sponsored by: Biodiversity Heritage Library

Generated 2 March 2011 11:06 PM

<http://www.biodiversitylibrary.org/pdf3/006032400042171>

This page intentionally left blank.

SUR UNE PETITE COLLECTION
DE
POISSONS RECUEILLIS DANS L'UELÉ

PAR LA MISSION DIRIGÉE PAR M. HUTEREAU

PAR

G.-A. BOULENGER

[M. le Commandant HUTEREAU, chef de la Mission ethnographique envoyée dans l'Uelé par le Ministère des Colonies belge, a bien voulu, à ma demande, faire parvenir au Musée du Congo quelques spécimens de petits Poissons recueillis dans les régions traversées par lui. La collection que décrit ici M. BOULENGER provient de Dungu, dans le district du Haut-Uelé. Les notes de M. BOULENGER montrent combien elle est intéressante déjà.

H. SCHOUTEDEN.]

MORMYRIDÆ.

1. — *Marcusenius Hutereau* sp. n.

Hauteur du corps 3 fois dans la longueur totale, longueur de la tête 4 fois. Tête longue comme haute; museau très court, arrondi, dépassant fortement la bouche, qui est située sous l'œil et dont la largeur est comprise $3 \frac{1}{2}$ fois dans la longueur de la tête; dents très petites, bicuspidés, 7 à la mâchoire supérieure, 8 à l'inférieure; narines au niveau de la pupille, la pos-

térieure touchant presque à l'œil; celui-ci de grandeur moyenne, plus long que le museau, $4\frac{1}{2}$ fois dans la longueur de la tête, $1\frac{1}{2}$ fois dans la largeur interoculaire. Dorsale à 19 rayons, commençant au-dessus du 10^e rayon de l'anale, sa base mesurant la moitié de la distance qui la sépare de la tête. Anale à 27 rayons, à égale distance de la base de la ventrale et de la caudale. Pectorale aussi longue que la tête, n'atteignant pas tout à fait l'extrémité de la ventrale. Caudale à lobes pointus. Pédicule caudal mince, sa hauteur 3 fois dans sa longueur, qui égale celle de la tête. 35 écailles le long de la ligne latérale, $\frac{8}{9}$ en série transversale sur le corps, $\frac{8}{7}$ entre la dorsale et l'anale, 12 autour du pédicule caudal. Corps et nageoires bruns, pointillés de noirâtre.

Longueur totale : 60 millimètres.

Un exemplaire.

Cette espèce se rapproche de *M. adpersus* GTHR., mais s'en différencie nettement par la bouche plus infère et les écailles plus grandes et par conséquent moins nombreuses.

2. — **Marcusenius brevis** sp. n.

Hauteur du corps $2\frac{3}{4}$ à 3 fois dans la longueur totale, longueur de la tête $3\frac{1}{2}$ à $3\frac{2}{3}$ fois. Tête longue comme haute; museau très court, arrondi, dépassant un peu la bouche, qui est subinfère et dont la largeur est comprise 4 fois dans la longueur de la tête; dents de moyenne grandeur, bicuspidés, 7 à la mâchoire supérieure, 8 à l'inférieure; narine postérieure plus bas que l'antérieure, tout près du bord inférieur de l'œil; celui-ci assez petit, de même longueur que le museau, 5 fois dans la longueur de la tête, un peu plus de 2 fois dans la largeur interoculaire. Dorsale à 19 rayons, commençant au-dessus du 4^e ou 5^e rayon de l'anale, sa base mesurant la moitié de la distance qui la sépare de la tête. Anale à 24 à 26 rayons, plus rapprochée de la caudale que de la base de la ventrale. Pectorale un peu plus courte que la tête, n'atteignant pas l'extrémité de la ventrale. Caudale à lobes pointus. Pédicule caudal 2 fois plus long que haut, mesurant les $\frac{2}{3}$ de la longueur de la tête. 42 à 44 écailles le long de la ligne latérale, $\frac{7-8}{10-11}$ en série transversale sur le corps, $\frac{8}{7}$ entre la dorsale et l'anale, 12 autour du pédicule caudal. Corps brunâtre, la tête plus foncée, semé, ainsi que les nageoires blanchâtres, de gros points et de macules irrégulières d'un brun foncé.

Longueur totale : 60 millimètres.

Deux spécimens.

Très voisin de *M. Lhuysii* STDR., du Sénégal et du Chari, ce *Marcusenius* s'en distingue par le corps plus court et les écailles moins nombreuses le long de la ligne latérale.

3. — **Gnathonemus Moorii** GTHR.

CHARACINIDÆ.

4. — **Alestes macrophthalmus** GTHR.

5. — **Nannæthiops tritæniatus** sp. n.

Hauteur du corps $3 \frac{1}{4}$ fois dans la longueur totale, longueur de la tête $3 \frac{1}{2}$ fois. Tête 2 fois longue comme large, un peu plus longue que haute, lisse en dessus; museau arrondi, plus court que l'œil, qui est compris 3 fois dans la longueur de la tête et un peu inférieur à la largeur interorbitaire; bouche subterminale, la lèvre supérieure dépassant légèrement l'inférieure, le maxillaire s'étendant jusqu'au dessous du bord antérieur de l'œil. Branchiospines courtes, au nombre de 10 au membre inférieur du premier arceau branchial. Dorsale à III 10-11 rayons, commençant au-dessus des ventrales, plus rapprochée de la caudale que de l'œil. Anale à III 7 rayons. Pectorale mesurant un peu plus des deux tiers de la longueur de la tête, un peu plus longue que la ventrale. Caudale fourchue, à lobes pointus. Pédicule caudal aussi long que haut. 34 ou 35 écailles en série longitudinale, 12 en série transversale, $4 \frac{1}{2}$ ou 5 entre la série de la ligne latérale et la nageoire ventrale; ligne latérale réduite aux 5 à 8 premières écailles. Trois bandelettes noires le long de chaque côté du corps, la médiane la plus large.

Longueur totale : 40 millimètres.

Quatre individus.

Outre la coloration, cette espèce se distingue de *N. unitæniatus* GTHR., dont elle est très voisine, par la position de la nageoire dorsale, qui commence un peu plus en arrière.

6. — **Distichodus altus** BLGR.

7. — **Nannocharax tænia** BLGR.

CYPRINIDÆ.

8. — **Barbus holotænia** BLGR.

9. — **Barbus urotænia** sp. n.

Hauteur du corps égale à la longueur de la tête, $3 \frac{1}{4}$ à $3 \frac{1}{3}$ fois dans la longueur totale. Museau arrondi, à peine de la longueur de l'œil, qui est comprise 3 fois dans celle de la tête et égale la largeur interorbitaire; bouche petite, infère; lèvres médiocrement développées; deux barbillons de chaque côté, l'antérieur mesurant le tiers de l'œil, le postérieur la moitié; de petits tubercules coniques sur le museau et le dessus de la tête. Dorsale à IV 9 rayons, située à égale distance de l'œil et de la caudale, à bord faiblement échancré; dernier rayon simple articulé, un peu plus court que la tête. Anale à III 5 rayons, atteignant presque la caudale. Pectorale mesurant les $\frac{2}{3}$ de la tête, n'atteignant pas la ventrale; celle-ci insérée sous le milieu de la base de la dorsale. Pédicule court, aussi long que haut. 27-29 écailles le long de la ligne latérale, $\frac{4 \frac{1}{2}-5 \frac{1}{2}}{5 \frac{1}{2}}$ en série transversale, $2-2 \frac{1}{2}$ entre la ligne latérale et la ventrale, 12 autour du pédicule caudal. Brun olivâtre en dessus, blanchâtre en dessous; une bande latérale brune assez mal définie le long du corps, prolongée sur le lobe inférieur de la caudale.

Longueur totale : 50 millimètres.

Trois spécimens.

Voisine de *B. inermis* PETERS, cette espèce en diffère surtout par le pédicule caudal beaucoup plus court.

10. — **Barbus tetrastigma** sp. n.

Hauteur du corps 3 à $3 \frac{1}{3}$ fois dans la longueur totale, longueur de la tête $3 \frac{2}{3}$ à 4 fois. Museau arrondi, aussi long que l'œil, qui est compris $3 \frac{1}{2}$ à $3 \frac{2}{3}$ fois dans la longueur de la tête et $1 \frac{1}{2}$ fois dans la largeur interorbitaire; bouche petite, terminale; lèvres médiocrement développées; deux barbillons de chaque côté, l'antérieur mesurant le diamètre de l'œil, le postérieur $1 \frac{1}{2}$ fois ce diamètre. Dorsale à III 7-8 rayons, située à égale distance de l'œil et de la caudale, à bord faiblement échancré; dernier rayon simple articulé, aussi long que la tête. Anale à III 5 rayons, n'atteignant pas la caudale. Pectorale mesurant les $\frac{3}{4}$ de la tête, n'atteignant pas la ventrale; celle-ci insérée sous le tiers antérieur de la dorsale. Pédicule caudal un peu plus long que haut. 26-28 écailles le long de la ligne latérale, $\frac{4 \frac{1}{2}}{4 \frac{1}{2}}$ en série transver-

sale, $2\frac{1}{2}$ -3 entre la ligne latérale et la ventrale, 12 autour du pédicule caudal. Jaunâtre; quatre taches noires arrondies de chaque côté du corps, les deux premières au-dessus de la ligne latérale, les deux dernières sur celle-ci.

Longueur totale : 58 millimètres.

Six spécimens.

Espèce très voisine de *B. trispilus*, dont elle se distingue par les barbillons plus courts et par le nombre des taches noires sur les côtés du corps.

11. — **Barbus pleuropholis** BLGR.

12. — **Chelæthiops elongatus** BLGR.

SILURIDÆ.

13. — **Clarias liocephalus** BLGR.

14. — **Auchenoglanis occidentalis** C. et V.

CYPRINODONTIDÆ.

15. — **Haplochilus Hutereaui** sp. n.

Hauteur du corps 3 fois dans la longueur totale, longueur de la tête $3\frac{1}{4}$ fois. Tête très aplatie; museau large, arrondi, un peu plus court que l'œil; bouche supérieure, menton dépassant le museau; œil aussi long que la région postoculaire de la tête, égalant environ les $\frac{2}{3}$ de la largeur interorbitaire. Dorsale à 8 rayons, commençant deux fois plus loin du bout du museau ou du bord antérieur de l'œil que de la caudale et au milieu de la base de l'anale; les plus longs rayons de la longueur de la tête ou un peu plus courts. Anale à 14-15 rayons. Pectorale mesurant les $\frac{3}{4}$ de la tête, s'étendant au delà de la base de la ventrale; celle-ci beaucoup plus rapprochée du bout du museau que de la caudale. Caudale arrondie, aussi longue que la tête. Pédicule caudal aussi long que haut. 23-24 écailles en série longitudinale, 16 autour du corps en avant des ventrales; ligne latérale absente. Jaunâtre, les écailles finement lisérées de brun; nageoires blanchâtres, avec quatre ou

cinq séries transversales de taches noirâtres sur la moitié postérieure de la dorsale et de l'anale et sur la caudale.

Longueur totale : 35 millimètres.

Trois spécimens.

Espèce voisine de *H. spilauchen* A. DUM. En diffère par la mâchoire inférieure dépassant la supérieure et le nombre moins élevé d'écaillés en série longitudinale.

16. — **Haplochilus nigricans** sp. n.

Hauteur du corps $4 \frac{1}{2}$ à $4 \frac{2}{3}$ fois dans la longueur totale, longueur de la tête $3 \frac{1}{3}$ à $3 \frac{1}{2}$ fois. Tête très aplatie; museau large, arrondi, aussi long que l'œil; bouche supère, menton dépassant légèrement le museau; œil $3 \frac{1}{2}$ fois dans la longueur de la tête, $1 \frac{1}{2}$ fois dans la largeur interorbitaire. Dorsale à 9 rayons, commençant environ deux fois plus loin de l'occiput que de la caudale, et au-dessus du tiers postérieur de l'anale; les plus longs rayons excèdent à peine la moitié de la tête. Anale à 15 rayons, les plus longs mesurant les $\frac{2}{3}$ de la tête. Pectorale un peu plus courte que la tête, atteignant la base de la ventrale ou un peu au delà; ventrale petite, insérée à égale distance du bout du museau et de la caudale. Caudale pointue, plus longue que la tête. Pédicule caudal légèrement plus long que haut. 28-29 écaillés en série longitudinale, 20 autour du corps en avant des ventrales; ligne latérale absente ou représentée par quelques impressions punctiformes. D'un brun noirâtre, avec des traces de séries longitudinales de taches rouges; nageoires noirâtres.

Longueur totale : 47 millimètres.

Trois spécimens.

Se rapproche surtout de *H. Grahami* BLGR., mais nageoire dorsale à rayons plus nombreux.

ANABANTIDÆ.

17. — **Anabas nanus** GTHR.

CICHLIDÆ.

18. — **Lamprologus tumbanus** BLGR.

19. — **Hemichromis fasciatus** PETERS.

GOBIIDÆ.

20. — **Eleotris uellensis** sp. n.

Hauteur du corps $4 \frac{1}{3}$ à $4 \frac{2}{3}$ fois dans la longueur totale, longueur de la tête $3 \frac{1}{3}$ à $3 \frac{1}{2}$ fois. Tête nue, un peu plus longue que large; museau large et arrondi; bouche supère, le menton dépassant fortement le museau; maxillaire s'étendant jusque sous le bord antérieur de l'œil; celui-ci de la longueur du museau, compris $4 \frac{1}{2}$ fois dans la longueur de la tête, égal à la largeur interoculaire; pas d'épine préoperculaire. Première dorsale à VI rayons, seconde à I 8 rayons; ces rayons courts. Anale à I 5 rayons. Pectorale mesurant les $\frac{2}{3}$ de la tête. Caudale arrondie-subacuminée, presque aussi longue que la tête. Longueur du pédicule caudal double de sa hauteur. Écailles à bord fortement denticulé, 30-32 en série longitudinale, 10 en série transversale; ventre nu. Jaunâtre, tacheté et pointillé de brun foncé; une barre noirâtre à la base de la nageoire caudale, qui porte des séries transversales de points bruns; des taches noires sur les nageoires dorsales et anale.

Longueur totale : 35 millimètres.

Cinq individus.

Espèce très voisine de *E. nanus* BLGR., du Nil.

